

Definition af diarré

Til vurdering af "forekomst af diarré" samt "proportion af svære tilfælde" kan det være en god idé, at foretage nogle registreringer i besætningen i løbet af 2-3 uger for at få så validt et resultat af simuleringsprogrammet som muligt. Dette kan gøres i to trin:

- Vurdering af om kalven har diarré
- Differentiering mellem "mild" eller "svær" diarré

Vurdering af om kalven har diarré.

Kalven har fæces med en konsistens, som er tyndere end normal. Der ses tilsmudsning af hale og perineum. Frekvensen af defækering er øget. Lugten kan være putrid eller syrlig. Farven af fæces/diarréen kan variere fra gullig, grøn til sort, og der kan være tilblanding af mucus, blod, fibrin eller fordøjet blod (melena).

Eksempler på diarré:



Differentiering mellem "mild" og "svær" diarré.

Diarréen vurderes som "svær", hvis:

- Kalven har haft diarré i ≥ 2 dage
- Eller hvis kalvens almene tilstand kan defineres som "Svær diarré" efter nedenstående skema.

Symptom	Mild diarré	Svær diarré
Appetit	Normal	Nedsat eller helt fraværende
Sutترفleks	Evt. let nedsat	Markant nedsat eller helt fraværende
Kropsholdning	Opstående	Ligger i brystleje eller på siden
Bevægelse	Normal- let vaklende	Vaklende eller bevæger sig ikke
Vægttab (% BW)	Max. 4-7%	8-12%
Indsynkning af øjne	Max. 1-3 mm	>4 mm
Hudfoldtest på halsen (sek.)	Max. 3-5 sek.	>6 sek.
Perifer hudtemperatur	Normal	Kold
Fugtighed af mundslimhinde	+/- tør og varm	Tør og kold
Rektaltemperatur	Normal-let forhøjet	Meget forhøjet eller kold

Forfatter: MSD Animal Health, modificeret efter flg. kilder:

-Svensson et al., 2003: *Morbidity in Swedish dairy calves from birth to 90 days of age and individual calf-level risk factors for infectious diseases* Preventive Veterinary Medicine 58, 179-197.

-Jean-Francois Valarcher 2014 (personlig kommunikation)

DK-NON-221000020